

## חוברת תרגול לעבודת הקיז לתלמידים העולים לכיתה י' - ברמת 5 ייחדות לימוד


מצורפת חוברת תרגול לעבודת הקיז עבור תלמידיוות ט' המועדווות ללמידה בביתה י' ברמת 5 ייח' (571).

לאחר שיח מקיף ועמוק עם צוותי הוראה, העבודה נכתבת לפי הקווים המנחים הבאים:

1. נושאים מרכזיים של כיתה ט'.
2. נושאים בעלי קשר ישיר לחומר הנלמד בתחילת ביתה י'.
3. תרגול תכלייתי ולא מעmis מדי.

### תוכן העניינים

2	.....	שברים אלגבריים
3	.....	המשוואת הריבועית
3	.....	מערכת משוואות ממעלה שנייה
4	.....	משולש ישר זווית
6	.....	משפחה המקבילות
10	.....	טרפז
12	.....	הקו ישר
13	.....	הfonקציה הקווית
14	.....	הfonקציה הריבועית
15	.....	פרבולה ישר
16	.....	שתי פרבولات
17	.....	פונקציה כללית - גраф הפונקציה ותכונותיו ...
19	.....	קטע אמצעים במשולש
21	.....	קטע אמצעים בטרפז



השאלות בעבודה לקוחות מס' ספר התרגול של ארצימדס בשאלון 571 לכיתה י'. צוות החטיבה יבחר נושאים רלבנטיים לעבודה לכל כיתה.

ל מידע על הספר : <https://bit.ly/3B8bQQA>

הזמןה מרוכזת בפניה ל"יש הפטות" באחת מהדרכיהם הבאות :

- במייל [yeshbooks@gmail.com](mailto:yeshbooks@gmail.com)

- באתר <https://bit.ly/3FQfqBy>

- טלפון 052-2285566

להזמנה ספר הבית עם שליח : <https://bit.ly/3ndOdNg>

## שברים אלגבריים

כדי למצצם שברים אלגבריים ניעזר בנוסחאות המכפל המקוצר ובפירוק הטרינום.

**נוסחאות המכפל המקוצר - מעלה שנייה:**

$$a^2 - b^2 = (a + b) \cdot (a - b) \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

**דוגמה מספרית:**

$$x^2 + 8x + 12 \quad \text{נפרק את הטרינום:}$$

$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = 12 \quad \rightarrow \quad 6 \cdot 2 = 12 \\ \underline{\quad} + \underline{\quad} = 8 \quad \quad \quad 6 + 2 = 8$$

פירוק הטרינום הוא:  $(x + 6) \cdot (x + 2)$

**מהו פירוק הטרינום?**

כדי לפפרק את הטרינום:  $x^2 + bx + c$  נמצא שני מספרים

$k_1$  ו-  $k_2$  שמכפלתם שווה ל-  $c$  וסכוםם שווה ל-  $b$ .

פירוק הטרינום לפי התבנית:  $(x + k_1) \cdot (x + k_2)$

1. מצמצו את הביטויים הבאים באמצעות פירוק לגורמים בעזרת הטרינום ונוסחאות המכפל המקוצר:

$$\frac{2b^2 - 72}{b^2 - 7b + 6} \quad \text{ט.} \quad \frac{k^2 + 4k + 4}{3k + 6} \quad \text{ג.} \quad \frac{m^2 + m}{m^2 - 1} \quad \text{ב.} \quad \frac{a^2 - a}{a - 1} \quad \text{א.}$$

$$\frac{(a^2 + 2a) \cdot (a - 1)}{(a - 2) \cdot (a^2 + a - 2)} \quad \text{ו.} \quad \frac{k^3 - 6k^2 - 16k}{k^3 - 4k} \quad \text{ו.} \quad \frac{a^3 - a}{a^2 - 2a + 1} \quad \text{ה.}$$

2. חבו וחסרו את השברים הבאים. מצמצו את התוצאה הכל הניתן:

$$\frac{ab}{a - 2b} + \frac{2ab - 3a^2}{4a - 8b} \quad \text{ט.} \quad \frac{2a^2}{2a^2 - 3a} - \frac{9}{6a - 9} \quad \text{ג.} \quad \frac{1}{a^2 + a} + \frac{a - 1}{a} \quad \text{ב.} \quad \frac{2}{a - 1} - \frac{1}{2a - 2} \quad \text{א.}$$

3. מצמצו את השברים ופשטו את הביטוי הכל הניתן:

$$\frac{a^3 - 4a^2 + 4a}{2a^2 - a} : \frac{a^2 - 6a + 8}{4a^2 - 1} \quad \text{ט.} \quad \frac{7x + 21}{2x - 4} \cdot \frac{x^2 - 4x + 4}{7x^2 - 63} \quad \text{ג.} \quad \frac{p^2 - 4}{p + 2} \cdot \frac{p + 3}{p - 2} \quad \text{ב.} \quad \frac{x^2 + 5x}{x} \cdot \frac{x^2}{3x + 15} \quad \text{א.}$$

**תשובות:**

$$(1) \text{ א. } a \cdot b. \quad \text{ב. } \frac{a}{a - 2} \cdot \frac{k - 8}{k - 2} \cdot \frac{a(a + 1)}{a - 1} \cdot \frac{2(b + 6)}{b - 1} \cdot \frac{k + 2}{3} \cdot \frac{m}{m - 1}$$

$$(2) \text{ א. } \frac{3}{2a - 2} \cdot \frac{a}{a + 1} \cdot \frac{x^2}{3} \cdot \frac{x - 2}{2(x - 3)} \cdot p + 3 \cdot b. \quad \text{ב. } \frac{3}{4} \cdot \frac{-3a}{4} \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{a}{a + 1}$$

### המשוואת הריבועית

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

**תזכורת!** נוסחת השורשים:

1. פתרו את המשוואות הבאות:

ב.  $x^2 - 4 = (2x + 4)(x + 7)$

א.  $x^2 - 2x + 6 = x(2x - 7)$

ד.  $x(2x - 1) - 3(x - 5) = (3x - 1)(2 + x) - 5$

ג.  $2(x - 1)(x - 5) = (x + 4)(2 - 2x)$

2. פתרו את המשוואות הבאות:

ב.  $\frac{x+1}{2x-3} - \frac{3x+1}{2x+3} = \frac{4x+6}{4x^2-9}$

א.  $\frac{3}{x+3} + \frac{4}{x-2} = \frac{6}{(x+3)(x-2)}$

ד.  $\frac{2}{x+2} - \frac{4}{6-3x} = \frac{x+5}{6x+12} + \frac{9}{x^2-4}$

ג.  $\frac{x-3}{x+3} - \frac{x+3}{2-x} = \frac{5x+21}{x^2+x-6}$

**תשובות:**

(1) א. 2, -11. ב. 0.5, 1. ג. -2, -16. ד. 6, -1.

(2) א. 4, 13. ב. 3, -1. ג. 2, 0. ד. 0.

### מערכת משוואות ממעלת שנייה

פתרו את המערכות הבאות וכתבו את הפתרון בתור זוג סדור ( $(x, y)$ ):

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$$

ב.

$$\begin{cases} y = x^2 + 3x + 8 \\ y = 2x^2 + 8x + 2 \end{cases}$$

א.

$$\begin{cases} xy = 9 \\ (x+1)(y-3) = 12 \end{cases}$$

ד.

$$\begin{cases} 4y + x = 0 \\ 4y^2 + x^2 = 5 \end{cases}$$


ג.

**תשובות:**



א. (-3, -3), (1, 9). ב. (-2, 0.5), (2, -0.5). ג. (1.4, 4.8), (4, -3). ד. (-6, 26), (1, 12).

### משולש ישר זווית

במשולש ישר זווית שזוויותיו  $30^\circ$ ,  $60^\circ$  ו-  $90^\circ$   
הניצב שמול הזווית  $30^\circ$  שווה באורכו למחצית היתר.



במשולש ישר זווית התיכון ליתר  
שווה באורכו למחצית היתר.



1. הימש AD הוא גובה במשולש  $\Delta ABC$  ששטחו 336 סמ"ר.

נתון:  $28 \text{ ס"מ} = BC$ ,  $30 \text{ ס"מ} = AC$ .

א. חשבו את אורך הקטע CD.

ב. חשבו את היקף המשולש  $\Delta ABC$ .

ג. סמן על גבי השרטוט את הנקודות E ו-F כאמצעי הצלעות AC ו-AB.  
בהתאם. חשבו את היקף המרובע DEAF.

2. הימש AD הוא גובה לבסיס במשולש שווה השוקיים  $\Delta ABC$ . הנקודה F היא אמצע השוק AB.

א. הוכיחו:  $AC = 2DF$ .

ב. נתון שהקטע EF הוא גובה במשולש  $\Delta BDF$ .


נתון:  $\angle BAC = 120^\circ$ .

הסבירו מדוע המשולש  $\Delta ADF$  הוא שווה צלעות.

ג. נתון:  $12 \text{ ס"מ} = AC$  חשבו את אורך הקטע EF.

ד. נסמן:  $BC = 8 \text{ ס"מ}$ . מהו שטח הטרפז ADEF? הקיפו את התשובה הנכונה:

12p .iv      9p .iii      6p .ii      4.5p .i



3. אלכסוני הטרפז ישר הזווית  $(AB \parallel CD)$   $(ABCD)$  נחתכים בנקודה O.


נתון:  $\angle AOD = 75^\circ$ ,  $\angle ABD = 45^\circ$ ,  $AD \perp CD$ .

א. הסבירו מדוע מתקיים:  $AB = AD$ .

ב. חשבו את גודל הזווית  $\angle ACD$ .

ג. הוכיחו:  $AC = 2AB$ .

ד. קבעו איזה מהקטעים, AD או DO, ארוך יותר. נמקו.



4. הנקודה D נמצאת על הצלע BC במשולש  $\Delta ABC$  הצלעות  $AB$  ו-  $AC$  חן בהתאם הבסיסים במשולשים שווים השוקיים  $\Delta ACD$  ו-  $\Delta ABD$ .
- א. הוכחו:  $\angle BAC = 90^\circ$ .
- ב. הנקודה E נמצאת על המשך הקטע  $AD$  כמתואר בشرطו. נתון:  $AE = AD$ ,  $BD \perp BE$ .
- הסבירו מדוע מתקיים:  $AB = BD$ .
- ג. חשבו את הזווית  $\angle ABD$ .
- ד. הוכחו:  $AC = BE$ .


**תשובות:**

- 1) א. 18 ס"מ. ב. 84 ס"מ. ג. 56 ס"מ.
- 2) ג. 3 ס"מ. ד. iii.
- 3) ב.  $30^\circ$ . ד. במשולש  $\Delta ADO$  הצלע  $AD$  ארוכה יותר כי הזווית שמול הצלע  $AD$  גדולה מהזווית שמול  $DO$ .
- 4) ג.  $60^\circ$ .

## משפחת המקבילות

**משפחת המקבילות** כוללת את המקבילית, המלבן, המעוין והריבוע.

**מקבילית** היא מרובע בו כל זוג צלעות נגדיות מקבילות.



• במקבילית כל שתי זוויות נגדיות שוות.

• (**הוכיח**) : מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות, הוא מקבילית.

• (**הוכיח**) : מרובע שבו כל שתי צלעות נגדיות שוות, הוא מקבילית.

• במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה.

• (**הוכיח**) : מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה הוא מקבילית.

• במקבילית סכום כל זוג זוויות סמוכות הוא  $180^\circ$ .

**כיצד ניתן להוכיח שמרובע הוא מקבילית? ... אם נכיח שבאותו מרובע יש:**


• זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות.

• שני זוגות של צלעות נגדיות שוות זו לזו.

• שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות זו לזו.

• שני זוגות של זוויות נגדיות שוות זו לזו.

• אלכסונים חוצים זה את זה.




1. הנקודה E נמצאת על הצלע CD במקבילית ABCD.

נתון :  $BE = AE$ ,  $BC = CE$ . נסמן :  $\angle ABE = \alpha$ .

הוכיחו :

$$\angle AED = \angle BEC$$

$$\angle AEB = \angle BAD$$




2. אלכסוני המלבן ABCD נחתכים בנקודה O.

$$\text{א. הוכיחו : } \angle ADO = \angle CBO = \angle ABO.$$

ב. הישרים DE ו-BF הם בהתאם חוצי זוויות OCB ו-ADO כמתואר בשרטוט. הוכיחו :  $DE = BF$ .

ג. הוכיחו : המרובע BEDF הוא מקבילית.



3. נתון הטרפז  $ABCD$  ( $AB \parallel CD$ ).

הנקודות  $M$  ו- $N$  נמצאות על הבסיס  $CD$   
כמפורט בشرطוט. נתון:  $AD = BM$ .


א. שחר טען:

"ניתן להוכיח שהמרובע  $ABMD$  הוא מקבילית".  
אם שחר צודק? נמקו את תשובהכם.

ב. נתון:  $\angle ABC = \angle ANC$ . הוכחו: המרובע  $ABCN$  הוא מקבילית.

ג. נתון שהמרובע  $ABMD$  הוא מקבילית. נתון:  $\angle BNM = \angle BMD$ .

הוכחו: המרובע  $ABND$  הוא טרפז שווה שוקיים.



4. הנקודות  $E$  ו- $F$  נמצאות על צלעות המקבילית  $ABCD$   
כמפורט בشرطוט. נתון:  $AF = CE$ .

א. מתן טען: "בעזרת הנתונים לא ניתן להוכיח  
שהמשולשים  $\triangle ADF$  ו- $\triangle BCE$  חופפים". האם הוא צודק? נמקו.

ב. נתון:  $AE = CE$ . האם ניתן להוכיח שהמרובע  $AECF$  הוא מעוין? נמקו.


ג. נתון:  $AECF$  מעוין והיקפו  $16 \text{ ס"מ}$ . נתון:  $BE = AE$ . הקיפו את **שתי הטענות** הנכונות:

i. שטח המעוין  $AECF$  גדול פי 2 משטח המשולש  $\triangle BCE$ .

ii. שטח המעוין  $AECF$  גדול פי 4 משטח המשולש  $\triangle BCE$ .

iii. שטח המקבילית  $ABCD$  גדול פי 4 משטח המשולש  $\triangle BCE$ .

iv. שטח המקבילית  $ABCD$  גדול פי 8 משטח המשולש  $\triangle BCE$ .



5. נתון המעוין  $ABCD$  שאלכסוניו נחתכים בנקודה  $O$ .

הנקודות  $E$  ו- $F$  נמצאות על האלכסון  $BD$ .

הנקודה  $F$  היא אמצע הקטע  $BO$ .


הנקודה  $E$  היא אמצע הקטע  $DO$ .

א. הוכחו:  $EO = FO$ .

ב. הוכחו: המרובע  $AFCE$  הוא מעוין.

ג. נתון:  $\angle AFO = 45^\circ$ .

הוכחו: המרובע  $AFCE$  הוא ריבוע.



6. הנקודה F נמצאת על האלכסון BD במקבילית ABCD. הנקודה E נמצאת מחוץ למקבילית.

$$\text{נתון: } \angle ADB = 45^\circ, BF = CF$$

א. הוכחו:  $CF \perp BD$ .


$$\text{ב. נתון: } DE \perp CE, DE = FC$$

הוכחו: המרובע CEDF הוא מלבן.

$$\text{ג. נתון: } 13 \text{ ס''מ} = CD, 5 \text{ ס''מ} = BF. \text{ חשבו את:}$$

1. שטח המשולש  $\Delta ABCD$ .

2. היקף המלבן CEDF.



7. נתון הריבוע ABCD שאלכסוניו נחתכים בנקודה E. הנקודה F נמצאת על המשך הצלע AB כך שנתנו:  $BF = AB$ .

הقطع DF חתך את הצלע BC בנקודה M.


א. הוכחו:  $\Delta BFM \cong \Delta CDM$ .

ב. חשבו את הזווית  $\angle MBE$ .

ג. הוכחו:  $EM \perp BC$ .

ד. הסבירו מדוע מתקיים:  $ME = BM$ .

ה. נתון ששטח הריבוע ABCD הוא 64 סמ"ר. חשבו את שטח הטרפז BEMF.



8. נתונה המקבילית ABCD שאלכסונייה נחתכים בנקודה E.

א. הקיפו את הטענות הנכונות:

i. אם  $AB = CD$  אז המרובע ABCD הוא ריבוע.

ii. אם  $AD = CD$  אז המרובע ABCD הוא מעוין.


iii. אם  $BE = AE$  אז המרובע ABCD הוא מלבן.

iv. אם  $AC \perp BD$  אז המרובע ABCD הוא בהכרח ריבוע.

ב. נתון: האלכסון BD חוצה את הזווית  $\angle ABC$ .

קבעו אם מתקיים:  $\Delta ABE \cong \Delta CBE$ . נוכיח את תשובתכם.

ג. נתון:  $\angle ABE = 45^\circ$ . הוכחו: המרובע ABCD הוא ריבוע.




9. (\*) אלכסוני הربוע  $ABCD$  נחתכים בנקודה  $O$ .  
המלבן  $EFMN$  שטחו שווה סמ"ר  $CLOA$  במשולש  $\Delta ABCO$   
כמתואר בשרטוט.  
נתון:  $4 \text{ ס"מ} = MF$ .  
חשבו את שטח:  
א. הربוע  $ABCD$   
ב. המשולש  $\Delta FMO$  (הדרך: הורידו גובה מ- $O$  לצלע  $BC$ ).

**תשובות:**

- 3) א. **שחר טעה.** כאשר יש במרובע זוג אחד של צלעות שהן מקבילות וגם שוות, אז המרובע הוא מקבילית. לעומת זאת, במרובע  $ABMD$  יש זוג אחד של צלעות מקבילות וזוג שני של צלעות שוות. לכן, המרובע  $ABMD$  אינו מקבילית.
- 4) א. **מתן צודק.** מהנתונים נובע שבשני המשולשים יש זווית שווה ושתי צלעות שוות. אולם, הזווית אינה בין שתי הצלעות ולכן אין אפשרות להיעזר במשפט החפיפה צלע-זווית-צלע כדי להוכיח חפיפה.  
ב. לא ניתן להוכיח שהמרובע  $AECF$  הוא מעוין. ג. i, iii.
- 6) ג. 1.  $42.5 \text{ סמ"ר}$ . 2.  $34 \text{ ס"מ}$ .
- 7) ב.  $\angle MBE = 45^\circ$ . ה.  $24 \text{ סמ"ר}$ .
- 8) א. ii, iii. ב. מתקיים.
- 9) א.  $64 \text{ סמ"ר}$ . ב.  $4 \text{ סמ"ר}$ .

### הטרפז




**טרפז** הוא מרובע שבו זוג צלעות נגדיות מקבילות ('בסיסים') וזוג צלעות שאין מקבילות ('שוקיים').


- סכום שתי הזוויות הצמודות אותה שוק שווה ל- $180^\circ$  מעלות.
- בטרפז שווה שוקיים האלכסונים שוים זה לזה.
- בטרפז שווה שוקיים האלכסונים שוים זה לזה.
- **(הוכיח)**: טרפז שבו האלכסונים שוים זה לזה הוא טרפז שווה שוקיים.
- **(הוכיח)**: טרפז שבו האלכסונים שוים זה לזה הוא טרפז שווה שוקיים.

**כיצד ניתן להוכיח שמרובע הוא טרפז?... אם נכיח ש:**


- בן זוג אחד של צלעות במרובע, מקבילות זו לזו (זהוג השני לא).
- זוג אחד של צלעות במרובע, מקבילות זו לזו אך אין שותה זו לזו באורךן.




1. נתונה המקבילית ABCD. הנקודה E היא אמצע הצלע AD. ממשיכים את הקטע CD עד הנקודה F כמתואר בשרטוט. הקטע AF חוצה את הצלע BC בנקודה G.  
א. הוכיחו: המרובע AGCE הוא מקבילית.  
ב. הוכיחו: המרובע AECF הוא טרפז.



2. אלכסוני המקבילית ABCD נחתכים בנקודה O. הנקודה E נמצאת מחוץ למקבילית כך שהמרובע ABEO הוא מקבילית.  
א. הוכיחו: המרובע CDOE הוא מקבילית.  
ב. נתנו: המרובע BECO הוא מלבן.  
הוכיחו: המקבילית ABCD היא מעוין.  
ג. הקטע EO חותך את הצלע BC בנקודה M.  
הוכיחו: שטחי הטרפזים ABMO ו-CDOM שוים זה לזה.  
ד. קבעו אם ניתן שהמרובע CDOM הוא דלתון. נמקו.



3. הנקודות E ו- F נמצאות על הצלע AB במקבילית ABCD כך שמתקיים:  $AE = EF = BF$
- חשבו את יחס השטחים  $\frac{S_{ABCD}}{S_{CFED}}$
  - נתון:  $CD = 18a$ . נסמן:  $CF \perp AB$ . שטח הטרפז CDEF הוא  $96a^2$ .
  - הביעו באמצעות a את אורץ CF.
  - נתון: שטח הטרפז CDEF הוא 384 סמ"ר. חשבו את היקף המקבילית ABCD.



4. בטרפז ABCD מופיעים הגבהים AE ו-BF. נתון:  $AD = AB$
- הוכיחו:  $\angle ADB = \angle BDC$
  - הגובה AE והאלכסון BD נחתכים בנקודה G. נסמן:  $\angle ADB = \alpha$ .
  - הביעו באמצעות  $\alpha$  את הזווית  $\angle AGB$ .
  - נתון:  $BD \perp BC$ . הסבירו מדוע מתקיים:  $\Delta AGB \sim \Delta FBC$ .
  - נתון: הטרפז ABCD הוא שווה שוקיים. מצאו את  $\alpha$ .

**תשובות:**

- 2) **לא יתכן.** נתבונן במרובע CDOM. הצלעות CM ו- OM שוות זו לזו כי שתיהן חצאי אלכסונים במלבן BECO. כדי שהמרובע CDOM יהיה דלטון, נוצרך שגם הצלעות DO ו- CD יהיו שוות זו לזו אך הדבר אינו אפשרי כי הן בהתאם היתר והניצב במשולש ישר הזווית OCD ועל כן בהכרח אינן שוות.
- (3) א. 1.5. ב. 8a. ג. 112 ס"מ.
- (4) ב.  $\alpha = 30^\circ$ . ג.  $\angle AGB = 90^\circ - \alpha$ .

### הקו הימער

שיפועו של הישר העובר דרך הנקודות  $(x_1, y_1)$  ו- $(x_2, y_2)$  הוא :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

משוואת הישר ששיעורו  $m$  אשר עובר בנקודה  $(x_1, y_1)$  היא :  
 $y - y_1 = m \cdot (x - x_1)$   
 כאשר שני ישרים מקבילים, אז שיעוריהם שווים :  $m_1 = m_2$

1. מצאו את המשוואת של הישר ששיעורו 1 ועובר בנקודה : א.  $(-1, -1)$  ב.  $(-0.5, 4)$

2. א. מצאו את המשוואות של הישר העובר בנקודה  $(4, 5)$  A ומקביל לישר  $y = x + 9$ .


ב. מצאו את המשוואות של היסרים המתקבלים לאחר שנזינו את הישר שמצאתם :  
 1. מעלה למרחק של 4 ייחודות.  
 2. ימינה למרחק של 4 ייחודות.

3. בשרטוט נתונים שיעורי קודקודיו המרובע ABCD .

א. מצאו את המשוואות של הצלעות AB ו-CD .

ב. קבעו אם המרובע ABCD הוא טרפז. נמקו.

ג. מצאו את המשוואת של הצלע BC והקיפו את הנקודה  
הנמצאת על המשך הצלע BC :  
 $(-1, 7) . 4$      $(0, 6) . 3$      $(1, 6) . 2$      $(10, -2) . 1$



**תשובות:**


1 א.  $y = -x + 3$  5. ב.  $y = -x - 2$

2 א.  $y = x - 3$  2. ב.  $y = x + 5$  1. ג.  $y = x + 1$


3 א. 3. ב. יתכן, הצלעות AB ו-CD מקבילות זו לזו.  
 $CD: y = \frac{1}{3}x - 1$ ,  $AB: y = \frac{1}{3}x + 3$

ג. המשוואת של BC :  $y = -x + 7$ . התשובה 2.


### הfonקציה הקווית



1. בשרטוט מופיעים הגרפים של הפונקציות  $g(x) = -x + 13$  ו-  $f(x) = 3x + 9$ .
- זהו איזה מהישרים - AB או CD - מתאים לכל אחת מהfonקציות. נמקו.
  - קבעו אייזו מהfonקציות עולה ואייזו מהfonקציות יורדת.
  - השלימו את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציות  $f(x)$  ו-  $g(x)$ .
  - עם הצירים:  $D(\underline{\quad}, \underline{\quad})$ ,  $C(\underline{\quad}, \underline{\quad})$ ,  $B(\underline{\quad}, \underline{\quad})$ ,  $A(\underline{\quad}, \underline{\quad})$ .
  - מצאו את תחומי החיוויות והשליליות של הפונקציה  $f(x)$ .



2. בשרטוט מופיעים הגרפים של הפונקציות:  $f(x) = -x + 6$  ו-  $g(x) = 0.5x$ .
- זהו איזה מהישרים AB ו- CO מתאים לכל אחת מהfonקציות. נמקו.
  - השלימו את שיעורי הנקודות:  $C(\underline{\quad}, \underline{\quad})$ ,  $B(\underline{\quad}, \underline{\quad})$ ,  $A(\underline{\quad}, \underline{\quad})$ .
  - חשבו את שטח המשולש ABCO.
  - חשבו את ערך המכפלה:  $f(3) \cdot g(0)$ .



3. נתונות משווהות הישרים:  $x - 2y = 6$  ו-  $2x - y = 3$ .
- זהו אייזו משווהה מתאימה לכל אחד מהישרים AC ו- BC. נמקו.
  - מצאו את שיעורי הנקודות E, D, C, B, A.
  - מצאו את תחומי החיוויות והשליליות של הישר BC.
  - רשמו את אחד הסימנים  $<$ ,  $=$ ,  $>$  במשבצת המיועדת לכך:

1. שטח המשולש  $\Delta ABCD$

2. שטח המשולש  $\Delta CEO$

ה. (\*) חשבו את שטח המרובע CDOE (הדרכה: העבירו את הישר CO וחלקו את המרובע למשולשים).

**תשובות:** 1) א. הישר AB מתאים לפונקציה  $f(x)$  והישר CD מתאים לפונקציה  $g(x)$ .

ב. הפונקציה  $f(x)$  עולה והfonקציה  $g(x)$  יורדת. ג.  $(A(-3,0), B(1,12), C(0,13), D(13,0))$ .

ד. חיוויות:  $x < -3$ ; שליליות:  $-3 < x$ .


2) א. הישר CO מתאים לפונקציה  $g(x)$  והישר AB מתאים לפונקציה  $f(x)$ .

ב.  $(A(0,6), B(6,0), C(4,2))$ . ג. 6 יח"ר. ד. 9.

3) א. משווהת AC  $0.5x + 3$ :  $y = 0.5x + 3$ . ב. BC  $y = 2x - 3$ :  $0.5x + 3 = 2x - 3$ .

ג. חיוויות:  $x < 1.5$ ; שליליות:  $x < 1.5$ . ד. 1.5. כ. 2. ה. 9.75. י. 1.5. ז. 1.5. ק. 1.5.

### הפונקציה הריבועית




1. לפניכם גרף הפונקציה הריבועית  $f(x) = x^2 - 4x$ . השלימו:

- גרף הפונקציה חותך את ציר ה- $x$  בנקודות \_\_\_\_\_ ו-\_\_\_\_\_.
- שיעור ה- $x$  של קודקוד הפרבולה הוא: \_\_\_\_\_.
- שיעור ה- $y$  של קודקוד הפרבולה הוא: \_\_\_\_\_.
- הfonקציה חיובית בתחום: \_\_\_\_\_ ושלילית בתחום: \_\_\_\_\_.
- הfonקציה  $f(x)$  עולה בתחום: \_\_\_\_\_ ויורדת בתחום: \_\_\_\_\_.

2. לפניכם הפרבולה  $f(x) = -x^2 + 9$  בקו רצוף והגרפים 1 ו- 2 בקו מקווקו.

נתון:  $AB = 7$  יח'.



א. מזיזים את הפונקציה אנכית כך שמתקבל גרף 1.

אייזו מהfonקציות הבאות מתאימה לגרף 1?

1.  $g(x) = x^2 + 2$       2.  $g(x) = x^2 - 7$

3.  $g(x) = -x^2 + 2$       4.  $g(x) = -x^2 - 7$

ב. אייזו מהfonקציות הבאות מתאימה לגרף 2?

1.  $h(x) = x^2 + 2$       2.  $h(x) = -x^2 + 2$

3.  $h(x) = x^2 + 7$       4.  $h(x) = -x^2 + 7$


3. נתונה הפרבולה  $f(x) = -x^2 - 2x + 15$ .  
הפרבולה חותכת את הצירים בנקודות B,C,D,O,C,D,A.

א. מצאו את שיעורי הנקודות 1-4.

ב. חשבו את אורך הקטע CD.

ג. חשבו את שטח המשולש ACO.

ד. העבירו על גבי השרטוט את הישר BC.



מצאו את משוואת הישר העובר בנקודה D ומקביל לישר BC.


ה. מצאו באיזה תחום הפונקציה  $f(x)$  יורדת וחובקת.

**תשובות:** 1. א.  $(0,0)$ ,  $(4,0)$ . ב.  $2$ . ג.  $-4$ . ד. חיובית:  $x < 4$  או  $0 < x < 4$ ; שלילית:  $0 < x < 4$ .

ה. עולה:  $x < 2$ ; יורדת:  $x < 2$ .

ב. 8 יח' אורך. ג. 40 יח' ר. ד.  $y = 3x - 9$ . ה.  $-3 < x < -1$ .

## פרבולה וישר



1. לפניכם גרף הפרבולה  $f(x) = x^2 - 3x$  החותך את ציר ה- $x$  בנקודה B ובראשית הצירים O. הישר  $g(x)$  שיפועו 2 עובר דרך ראשית הצירים וחותך את הפרבולה בנקודה A שייעור ה- $x$  שלו הוא 5.

א. מצאו את שיעור ה- $y$  של הנקודה A.

ב. מצאו את משוואת הישר  $(x)g$ .

ג. חשבו את שטח המשולש  $\Delta OAB$ .

ד. הקיפו את שלוש הטענות הנכונות:

$f(-1) \cdot g(-1) < 0$  .iii


$g(-2) < f(-2)$  .ii

$g(2) < f(2)$  .i

$g(4) < f(4)$  .vi

$0 < f(3) + g(3)$  .v

$f(6) < g(6)$  .iv



2. הישר  $y = -x + 7$  והפרבולה:  $g(x) = x^2 - 8x + 7$  שקודקודה בנקודה C, חותכים את הצירים בנקודות A, B ו-D כמתואר בשרטוט. הישרים AE ו- EF מקבילים לצירים.

א. מצאו את שיעורי הנקודות A, B, C, D, E, F.

ב. חשבו את אורך הקטעים AD ו- AF.

ג. קבעו אם הישרים BC ו- CD מאונכים זה לזה. נמקו.

ד. חשבו את שטח המשולש  $\Delta ABD$ .

ה. מצאו עבור אילו ערכי k נחתכים גרף הפרבולה  $(x)g$  והישר  $y = k$  בשתי נקודות שונות.

**תשובות:**


1. א.  $y_A = 10$  .ב.  $y_A = 10$  .ג.  $y_A = 10$  .ד.  $y_A = 10$  .ה.  $y_A = 10$  .ו.  $y_A = 10$

2. א.  $A(0,7), B(1,0), C(4,-9), D(7,0), E(8,7), F(8,0)$

ב.  $10.63$  ייח' אורך  $= AF$ ,  $9.9$  ייח' אורך  $= AD$ . ג. אינם מאונכים. מכפלת השיפועים אינה  $-1$ .

ד.  $21$  ייח' ר. ה.  $k < -9$

### שתי פרבולות



נתונים הגרפים של הפונקציות הריבועיות :

$$\text{. } g(x) = -(x+1)(x-5), f(x) = x^2 - 8x + 15$$

א. קבעו איזה מהגרפים מתאים לכל אחת מהפונקציות.

ב. הפרבולות חותכות זו את זו ואת הצירים בנקודות A, B, C, D, E, F.

השלימו את שיעורי הנקודות :

$$\text{. } F(\underline{\quad}, \underline{\quad}), E(\underline{\quad}, \underline{\quad}), D(\underline{\quad}, \underline{\quad}), C(\underline{\quad}, \underline{\quad}), B(\underline{\quad}, \underline{\quad}), A(\underline{\quad}, \underline{\quad})$$


ג. חשבו את שטח המשולש  $\Delta CDE$ .

ד. חשבו את המרחק בין צירי הסימטריה של הפרבולות.

**תשובות:**

- א. גראף 1 :  $A(0,15), B(0,5), C(-1,0), D(1,8), E(5,0), F(3,0)$ . גראף 2 :  $f(x) = x^2 - 8x + 15$ . ב.  $g(x) = -(x+1)(x-5)$ . ג. 24 יח"ר. ד. 2 יח' אורך.

### פונקציה כללית - גраф הפונקציה ותכונותיו



1. לפניכם גраф הפונקציה  $(x)f$ .

א. עבור כל טענה קבעו האם היא נכונה או שגויה. הסבירו:

ו. הפונקציה  $(x)f$  אינה זוגית ולאינה אי-זוגית.


ii. מתקיים:  $0 < (4)f < (1)f$ .

iii. אחד מפתרונות המשוואה  $1 = (x)f$  הוא שלילי.

ב. מצאו את התחום שבו הפונקציה  $(x)f$  שלילית ויורדת.

ג. נתונות המשוואות הראשונה:  $1 = (x)f$  והשנייה:  $3 = (x)f$ .

קבעו לאיזה משווה יש יותר פתרונות. נמקו את תשובתכם.



2. לפניכם גраф הפונקציה  $(x)f$ .

א. מצאו את תחומי העלילה והירידה של הפונקציה  $(x)f$ .

ב. קבעו עבור אילו ערכי  $k$  הישר  $y = k$  חותך את גראף

הפונקציה  $(x)f$  בשלוש נקודות.


ג. לירוי טען: "רובה פתרונות המשוואה:  $3 = (x)f$  הם שליליים".

האם לירוי צודק? נמקו את תשובתכם.

ד. נתונה הפונקציה:  $|f(x)| = g(x)$ .

1. קבעו כמה פתרונות יש למשווהה:  $1 = g(x)$ .

2. מצאו את שיעורי נקודות המינימום של הפונקציה  $(x)g$ .



3. במערכת הצירים שלפניכם מופיעים הישר  $(x)f$  וגראף

הפונקציה  $(x)g$  בתחום:  $-6 \leq x \leq 4$ .

א. מצאו את משווהת הישר.

ב. מצאו את תחומי העלילה והירידה של הפונקציה  $(x)g$ .

ג. פתרו את המשווהה:  $(x)g = (x)f$ .

ד. פתרו את אי השוויון:  $(x)g < 2 + x$ .

ה. מצאו באיזה תחום שתי הפונקציות עלות.

ו. מצאו באיזה תחום שתי הפונקציות שליליות.

